

ΑΠΙΦΑΡΜ  
αυ



Ядро нашей фирмы с самого ее основания составляют ученые-медики, ранее работавшие в различных институтах СО РАМН.

Основная концепция, положенная в основание деятельности фирмы, - рыночно ориентированная наука, которая в новых экономических условиях должна стать непосредственной производительной силой. Возросший спрос населения на продукты здорового питания и биологически активные добавки к пище определил основной профиль деятельности предприятия.

Сотрудничая с Российским потребительским обществом АРГО, приятно видеть, что эти наши устремления полностью совпадают, что мы вместе делаем все возможное, чтобы учесть желания потребителей.

*Мы делаем общее дело,  
и наша главная задача -  
здоровье нации.*



**Ковшик Игорь Геннадьевич**  
директор компании АПИФАРМ, к.м.н.

Компания АПИФАРМ специализируется на производстве биологически активных добавок к пище и целебной косметике. Вся продукция фирмы в обязательном порядке проходит лабораторные и клинические испытания. Наряду со специалистами компании, для проведения исследований привлекается ряд профильных научных организаций Сибирского отделения Российской академии медицинских наук, среди которых: ГУ НЦ экспериментальной и клинической медицины СО РАМН, ГУ НИИ клинической иммунологии СО РАМН и ГУ НИИ терапии СО РАМН. На данный момент продукцию АПИФАРМ можно разделить на следующие группы:

- Набор 'Рецепт успеха', предназначенный в основном для коррекции массы тела - комплекс продуктов, влияющих на жировой и углеводный обмен. Состоит из БАД на основе природного биологически активного вещества хитозана Каталитин и Хитолан, БАД Лептоник, а также заменителя сахара Аргосластин. Можно применять как весь комплекс, так и каждый препарат по отдельности, в зависимости от поставленной задачи.
- Серия БАД Лептины для коррекции обмена веществ при различных заболеваниях. БАД на основе прополиса и алтайских трав серии Лептины являются тонкими регуляторами окислительно-восстановительных процессов в организме. Важность такой регуляции определяется универсальностью нарушений антиоксидантной защиты при всех без исключения заболеваниях. Данные БАД не подменяют собой функции лекарственных препаратов, а способствуют коррекции обменных нарушений с учетом особенностей отдельных видов патологии.

**Душкин Михаил Иванович**

заведующий лабораторией иммунологии атеросклероза  
ГУ НИИ клинической иммунологии СО РАМН, д.м.н.





# Каталитин

Биологически активная добавка к пище Каталитин разработана учеными и специалистами Сибирского отделения Российской академии медицинских наук

## СОСТАВ:

- хитозан
- левзея сафлоровидная
- кукурузные рыльца
- плоды шиповника


## БАД Каталитин дает мощный комплексный эффект:

- снижение массы тела
- снижение аппетита
- усиление катаболизма жиров
- нормализацию уровня липидов крови
- торможение атеросклеротических процессов в сердечно-сосудистой системе организма

**Безопасность БАД Каталитин  
подтверждена**



Изменение массы тела человека под действием Каталитина



Клиническая эффективность  
БАД Каталитин подтверждена  
ГУ НЦ КЭМ СО РАМН

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУ НЦ КЭМ СО РАМН

Член-корреспондент РАМН

В.А.Щурупов

июль 2005 г.

**Рекомендации по применению БАД «Каталитин», БАД «Хитозан» и  
комбинированного подсластителя «Аргосластин»**

Исследования клинической эффективности БАД «Каталитин», БАД «Хитозан» и комбинированного подсластителя «Аргосластин» при ожирении, проведенные в НЦ клинической и экспериментальной медицины СО РАМН, показали что:

1. Прием БАД «Каталитин», «Хитозан» и подсластителя «Аргосластин» оказывает положительное влияние на самочувствие пациентов с ожирением.
2. Комплексный сочетанный прием БАД «Каталитин», «Хитозан» и подсластителя «Аргосластин», приводит к достоверному эффективному снижению массы тела пациентов с ожирением.
3. 24-дневный прием БАД «Каталитин» и «Хитозан» отдельно или в сочетании с подсластителем «Аргосластин» вызвал достоверное снижение уровня общего холестерина за счет снижения ЛПНП, снижение уровня КАТ и триглицеридов, что свидетельствует об их антиатерогенных свойствах.
4. После приема подсластителя «Аргосластин» отдельно или в сочетании с БАД «Каталитин» и «Хитозан» у пациентов с инсулинорезистентностью наблюдается снижение сахара в крови, что указывает на возможность их использования у больных сахарным диабетом в дополнение к традиционной терапии и для профилактики этого заболевания.
5. Прием подсластителя «Аргосластин», особенно в его сочетании с БАД «Каталитин» и «Хитозан», приводит к достоверному снижению дислипидемического коэффициента у пациентов с ожирением, что свидетельствует об увеличении использования жиров для энергетических затрат в организме.
6. Сочетанное применение 3-х препаратов оказывает более выраженное действие на все исследованные показатели, чем каждый из них по отдельности, что свидетельствует о суммации и взаимном потенцировании изученных физиологических эффектов.
7. Активность ферментов печени АЛТ и АСТ при действии данных препаратов не изменялась, что свидетельствует об отсутствии отрицательных побочных эффектов данных БАД на функции печени.

**Вывод:** БАД «Каталитин», БАД «Хитозан» и комбинированный подсластитель «Аргосластин» могут применяться для снижения избыточной массы тела при алиментарном ожирении, атеросклерозе и других нарушениях жирового обмена как по отдельности, так и в любых сочетаниях. Нормализация показателей углеводного и жирового обмена при их сочетанном применении позволяет особенно рекомендовать применение данных добавок при сахарном диабете II типа.



# Хитолан

Биологически активная добавка к пище Хитолан разработана учеными и специалистами Сибирского отделения Российской академии медицинских наук


## СОСТАВ:

- крабовый хитозан высокой степени очистки
- вспомогательные вещества

**БАД Хитолан содержит не менее 85% хитозана, который:**

- связывает и выводит из организма избыток жиров и холестерина
- снижает нагрузку на печень
- обладает противоязвенным действием
- нормализует микрофлору кишечника
- связывает и выводит токсичные элементы и кишечные токсины
- связывает и выводит радиоактивные изотопы
- стимулирует иммунную систему
- повышает устойчивость организма к инфекциям, нейтрализует токсичные перекисные соединения

Влияние применения схемы 'Катализин + Хитолан' на массу тела



**Безопасность БАД Хитолан  
подтверждена**

Клиническая эффективность  
БАД Хитолан подтверждена  
ГУ НЦ КЭМ СО РАМН

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУ НЦ КЭМ СО РАМН

Член-корреспондент РАМН

В.А.Щекуцкий

июля 2005 г.

**Рекомендации по применению БАД «Каталитин», БАД «Хитолан» и  
комбинированного подсластителя «Аргосластин»**

Исследования клинической эффективности БАД «Каталитин», БАД «Хитолан» и комбинированного подсластителя «Аргосластин» при ожирении, проведенные в НЦ клинической и экспериментальной медицины СО РАМН, показали что

1. Прием БАД «Каталитин», «Хитолан» и подсластителя «Аргосластин» оказывает положительное влияние на самочувствие пациентов с ожирением.
2. Комплексный сочтанный прием БАД «Каталитин», «Хитолан» и подсластителя «Аргосластин», приводит к достоверному эффективному снижению массы тела пациентов с ожирением.
3. 24-дневный прием БАД «Каталитин» и «Хитолан» отдельно или в сочетании с подсластителем «Аргосластин» вызвал достоверное снижение уровня общего холестерина за счет снижения ЛНПД, снижение уровня КАТ и триглицеридов, что свидетельствует об их антатерогенных свойствах.
4. После приема подсластителя «Аргосластин» отдельно или в сочетании с БАД «Каталитин» и «Хитолан» у пациентов с инсулинорезистентностью наблюдалось снижение сахара в крови, что указывает на возможность их использования у больных сахарным диабетом в дополнение к традиционной терапии и для профилактики этого заболевания.
5. Прием подсластителя «Аргосластин», особенно в его сочетании с БАД «Каталитин» и «Хитолан», приводит к достоверному снижению дыхательного коэффициента у пациентов с ожирением, что свидетельствует об увеличении использования жиров для энергетических затрат в организме.
6. Сочетанное применение 3-х препаратов оказывает более выраженное действие на все исследованные показатели, чем каждый из них по отдельности, что свидетельствует о суммации и взаимном потенцировании изученных физиологических эффектов.
7. Активность ферментов печени АЛТ и АСТ при действии данных препаратов не изменялась, что свидетельствует об отсутствии отрицательных побочных эффектов данных БАД на функции печени.

**Заключение:** БАД «Каталитин», БАД «Хитолан» и комбинированный подсластитель «Аргосластин» могут применяться для снижения избыточной массы тела при алиментарном ожирении, атеросклерозе и других нарушениях жирового обмена как по отдельности, так и в любых сочетаниях. Нормализация показателей углеводного и жирового обмена при их сочетанном применении позволяет особенно рекомендовать применение данных добавок при сахарном диабете II типа.

# Аргосластин

Пищевая добавка Аргосластин разработана учеными и специалистами Сибирского отделения Российской академии медицинских наук



## СОСТАВ:


- ацесульфам
- аспартам
- вспомогательные вещества

Аргосластин обладает большей сладостью, чем сахар, имеет нулевую калорийность и прекрасно сочетается с биологически активными добавками к пище. Он позволит Вам снизить калорийность рациона без лишних усилий и повысить эффект от диет, занятий спортом и применения БАД.

## Пищевая добавка Аргосластин отличается:

- полноценным вкусом сахара
- отсутствием металлического привкуса
- абсолютной безвредностью для печени
- быстрой растворимостью
- сохранением вкусовых качеств при кипячении

Влияние Аргосластина (группа 1) и Аргосластина в сочетании с Хитоланом и Каталимином (группа 3) в сравнении с действием только Хитолана и Каталимина (группа 2) на вес пациентов с ожирением



Клиническая эффективность  
Аргосластина подтверждена  
ГУ НЦ КЭМ СО РАМН

Безопасность Аргосластина  
подтверждена

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУ НЦ КЭМ СО РАМН

Член-корреспондент РАМН

В.А. Шкурный

июль 2005 г.

Рекомендации по применению БАД «Катализин», БАД «Хитолан» и  
комбинированного подсластителя «Аргосластин»



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК  
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
КЛИНИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  
МЕДИЦИНЫ

630117, г. Новосибирск  
ул. Академическая Тимина, 2  
Тел. факс: (3832)33-44-56  
nck@yandex.ru

10315408/29419 ОФК по Сметному р-ну г. Новосибирск  
ИНН 5408137430 КПП 540801001 ГУ НЦ КЭМ СО РАМН  
р/с 03423410891  
Банк – Союзный РБД г. Новосибирск  
БИК 545030000, р/с 401051010000000000

От \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

#### РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ САХАРОЗАМЕСТИТЕЛЯ АРГОСЛАСТИН, ОСНОВАННЫЕ НА  
РЕЗУЛЬТАТАХ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ КЛИНИЧЕСКОЙ  
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ СО РАМН

Подходя добавка нового поколения АРГОСЛАСТИН разработана учеными и специалистами СО РАМН и в настоящее время не имеет аналоговых и зарубежных аналогов. АРГОСЛАСТИН представляет собой смесь двух видов и изомеров. В отличие от существующих сахарозаменителей (сладкий, аналогов АРГОСЛАСТИН имеет приятный вкус, обладает большей сладкостью (более чем в 200 раз сладок сахар), имеет нулевую калорийность и прекрасно сочетается с любыми БАДами.

Подходя добавка АРГОСЛАСТИН:

- не имеет неприятного привкуса;
- не вызывает расстройств желудка;
- абсолютно не вредит;
- не обладает мусорными и канцерогенными свойствами.

Единственный противопоказанием для приема АРГОСЛАСТИНА является наличие фенилкетонурии, редкого наследственного заболевания, связанного с нарушением выработки и усвоения фенилаланина организмом.

Клинические исследования проведенные в лаборатории изолированных и обычных нормальных НЦ КЭМ СО РАМН показали, что АРГОСЛАСТИН может быть рекомендован:


1. Для эффективного снижения сахара и крови у больных сахарным диабетом I и II типа. Имеет высокие организмотические свойства АРГОСЛАСТИНА позволяет проводить полноценную жизнь больных в равной степени с сахарными диабетом.
2. Для профилактики сахарного диабета, повышения эффективности низкокалорийных диет, снижения стрессов и нормализации БАДов и после коррекции избыточного веса. Прием АРГОСЛАСТИНА позволяет перейти с «углеводного» на «белково-жирового» питания, улучшить обмен и ускорить освобождение организма от избытка жиров.

Директор Научного центра клинической  
и экспериментальной медицины (ГОУНЦ  
КЭМ СО РАМН, и.о.н., профессор

В.А. Шкурный



ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ СПРАШИВАЙТЕ АННОТАЦИЮ



# Лептоник

Биологически активная добавка к пище Лептоник разработана учеными и специалистами Сибирского отделения Российской академии медицинских наук

## СОСТАВ: экстракты:


- прополиса
- чаги
- родиолы розовой
- левзеи сафлоровидной

**БАД Лептоник эффективно устраняет основные признаки адаптационного стресса и используется:**

- в программе контроля массы тела 'Рецепт успеха'
- в программе коррекции биоритмов 'Ритмы жизни'



Влияние БАД Лептоник на признаки стресса адаптации



**Клиническая эффективность  
БАД Лептоник подтверждена  
ГУ НЦ КЭМ СО РАМН**

**Безопасность БАД Лептоник  
подтверждена**



ГУ НАЦИОНАЛЬНОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ СО РАМН

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГУ НЦ КЭМ СО РАМН

Член-корреспондент РАН  
В.А.Иванов

1999.09.10

**Рекомендации по применению БАД «Калатин», БАД «Лептоник» и комбинации БАД «Лептоник» и «Арсенитин»**

Восстановление естественной эффективности БАД «Калатин», БАД «Лептоник» и комбинации БАД «Лептоник» и «Арсенитин» при сахарном, гестационном и НД (наследственном и приобретенном) диабете СО РАМН, показано что:

1. Прием БАД «Калатин», «Лептоник» и комбинации «Арсенитин» позволяет восстановить клетки на структурном уровне с сахарным.
2. Комбинированный прием БАД «Калатин», «Лептоник» и комбинации «Арсенитин» приводит к достоверному эффективному снижению уровня глюкозы в крови.
3. 24-дневный прием БАД «Калатин» и «Лептоник» снижает риск и степень и выраженности «Арсенитин» вызванной дисфункцией системы органов общего иммунитета на уровне системы ТНФ, снижая уровень КЛТ и восстанавливая, что свидетельствует об их иммуномодулирующих свойствах.
4. После приема комбинации «Арсенитин» сдается кровь и анализы с БАД «Калатин» и «Лептоник» у пациентов с инсулинозависимым диабетом выявляются снижение сахара в крови, что указывает на возможность их использования у больных сахарным диабетом и доказывает в традиционной терапии и для профилактики сахарного диабета.
5. Прием комбинации «Арсенитин», «Лептоник» и его комбинации с БАД «Калатин» и «Лептоник», приводит к достоверному снижению дислипидемического коэффициента у пациентов с сахарным, что свидетельствует об их снижении холестерина крови для кардиологических целей в терапии.
6. Систематическое применение 3-х препаратов снижает более выраженное действие на все исследуемые показатели, чем каждый из них по отдельности, что свидетельствует о синергическом и комплексном иммуномодулирующем, физиологическом эффекте.
7. Активность ферментов печени АЛТ и АСТ при диабете снижается при приеме комбинации БАД «Калатин», «Лептоник» и комбинации «Арсенитин», что свидетельствует об улучшении функционального состояния печени при приеме БАД во время лечения.

Выводы: БАД «Калатин», БАД «Лептоник» и комбинация «Арсенитин» и комбинация «Арсенитин» могут применяться для снижения избыточного веса тела при сахарном, гестационном, гестационном и другом нарушении углеводного обмена при наличии избытка при их применении приемлемый уровень глюкозы, снижая уровень сахара в крови при приеме БАД во время лечения.

**Некоторые схемы применения Лептоника для коррекции дисоритмов**

**При пониженном артериальном давлении**

|            |               |       |            |                     |       |
|------------|---------------|-------|------------|---------------------|-------|
|            | ‘Жабворонкам’ |       |            | ‘Собам’ и ‘голубям’ |       |
| Лептоник   | 08-00         | 12-00 | Лептоник   | 10-00               | 14-00 |
| Лептоседин | 22-00         |       | Лептоседин | 24-00               |       |

**При пониженной функции щитовидной железы**

|                        |               |       |       |                       |                     |       |       |
|------------------------|---------------|-------|-------|-----------------------|---------------------|-------|-------|
|                        | ‘Жабворонкам’ |       |       |                       | ‘Собам’ и ‘голубям’ |       |       |
| Лептоник (Вазолептин)* | 08-00         | 12-00 | 16-00 | Лептоник (Вазолептин) | 10-00               | 14-00 | 18-00 |
| Вазолептин             | 20-00         |       |       | Вазолептин            | 22-00               |       |       |
| Лептоседин             | 22-00         |       |       | Лептоседин            | 24-00               |       |       |

\* – при наличии противопоказаний к Лептонику применяется Вазолептин

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ СПРАШИВАЙТЕ АННОТАЦИЮ

# Лептопротект

Биологически активная добавка к пище Лептопротект разработана учеными и специалистами Сибирского отделения Российской академии медицинских наук




## СОСТАВ: экстракты:


- прополиса
- травы чабреца
- корня солодки
- цветков ноготков
- травы череды
- березовых почек
- шишек хмеля
- листьев мать-и-мачехи
- корня левзеи сафлоровидной

**БАД Лептопротект повышает общую сопротивляемость организма и может использоваться при:**

- воспалительных заболеваний дыхательных путей
- склонности к частым простудным заболеваниям

**Безопасность БАД Лептопротект подтверждена**





#### Рекомендация по применению БАД «Лептопротект»

Исследования клинической эффективности БАД «Лептопротект», ТУ 9197-015-47514137-03 при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, проведенные в НИИ клинической иммунологии СО РАМН, показали, что при применении данной БАД на фоне традиционной терапии происходило более быстрое и полное купирование клинической симптоматики, усиление эффекторных механизмов неспецифической резистентности организма после применения БАД.

**Заключение:** На основании результатов клинических исследований данная БАД может быть рекомендована в качестве общеукрепляющего средства, улучшающего неспецифическую резистентность организма, в том числе при воспалительных заболеваниях дыхательных путей и склонности к частым простудным заболеваниям.

Одна из схем применения Лептопротекта для коррекции биоритмов

| «Жаборонкам»           |       |             |
|------------------------|-------|-------------|
| Лептоник (Вазолептин)* | 08-00 | 12-00       |
| Лептопротект           | 12-00 | 16-00 20-00 |
| Лептоседин             | 22-00 |             |

| «Собам» и «голубям»   |       |             |
|-----------------------|-------|-------------|
| Лептоник (Вазолептин) | 10-00 | 14-00       |
| Лептопротект          | 14-00 | 18-00 22-00 |
| Лептоседин            | 24-00 |             |

\* – при наличии противопоказаний к Лептонику применяется Вазолептин



# Лептоседин

Биологически активная добавка к пище Лептоседин разработана учеными и специалистами Сибирского отделения Российской академии медицинских наук


## СОСТАВ: экстракты:

- прополиса
- травы пустырника
- листьев мяты перечной
- травы душицы
- травы чабреца

## БАД Лептоседин улучшает функциональное состояние ЦНС и может использоваться при:

- бессоннице
- повышенной нервной возбудимости
- астено-вегетативном синдроме
- астено-невротическом синдроме
- нейро-циркуляторной дистонии
- для нормализации биоритмической структуры жизнедеятельности организма

Эффект БАД Лептоседин при комплексной терапии



**Безопасность БАД Лептоседин  
подтверждена**

Клиническая эффективность  
БАД Лептоседин подтверждена  
ГУ НЦ КЭМ СО РАМН



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУ НЦ КЭМ СО РАМН

Член-корреспондент РАМН

В.А.Шкурпый

июля 2005 г.



#### Рекомендации по применению БАД «Лептоседин»

Исследования клинической эффективности БАД «Лептоседин» ТУ 9197-018-47514137-03 при нейроциркуляторной дистонии и астено-вегетативном синдроме, проведенные в НЦ клинической и экспериментальной медицины СО РАМН, показали более раннее снижение артериального давления на фоне приема данной БАД (на 3-й-4-й день проводимой терапии) по сравнению с группой контроля (на 5-й-7-й день), при этом на фоне БАД «Лептоседин» происходило более полное купирование вегетативной симптоматики.

Контрольное исследование кардиоритма позволило констатировать положительную динамику вегетативного профиля у 19 пациентов в исследуемой группе, что составило 76%, и у 11 (55%) человек контрольной группы.

Особого внимания заслуживает тот факт, что больные, получавшие БАД, не принимали лекарственных препаратов седативного действия.

**Заключение:** БАД «Лептоседин» может применяться в качестве общеукрепляющего средства, улучшающего функциональное состояние нервной системы, в том числе при повышенной нервной возбудимости, бессоннице, астено-вегетативном и астено-невротическом синдромах, нейроциркуляторной дистонии, для нормализации биоритмологической структуры жизнедеятельности организма.

**С**елективная ступенчатая экстракция представляет собой комплекс технологических приемов, позволяющих на каждой ступени экстракции извлекать строго определенные активные вещества, оставляя за бортом те компоненты, которые являются нежелательными для данного препарата.

В результате получаемые препараты отличаются высокой эффективностью при использовании низких доз действующих веществ, они стандартизированы по целевым компонентам и очищены от нежелательных примесей.

# Нефролептин

Биологически активная добавка к пище Нефролептин разработана учеными и специалистами Сибирского отделения Российской академии медицинских наук



## СОСТАВ: экстракты:

- прополиса
- травы горца птичьего
- листьев брусники
- листьев толокнянки
- цветков ноготков
- корня солодки


**БАД Нефролептин улучшает работу почек и мочевыделительной системы и может использоваться при:**

- инфекционных заболеваниях почек
- инфекционных заболеваниях мочевыводящих путей

**Безопасность БАД Нефролептин  
подтверждена**



## Эффект БАД Нефролептин при комплексной терапии



Клиническая эффективность  
БАД Нефролентин подтверждена  
ГУ НЦ КЭМ СО РАМН



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУ НЦ КЭМ СО РАМН

Член-корреспондент РАМН

В.А.Шкурин

июль 2005 г.



#### Рекомендации по применению БАД «Нефролентин»

Исследования клинической эффективности БАД «Нефролентин», ТУ 9197-014-47514137-03 при пиелонефрите и цистите, проведенные в НЦ клинической и экспериментальной медицины СО РАМН, показали более полное купирование болевого синдрома и диспурических явлений у больных, получавших БАД «Нефролентин».

В процессе лечения, проводимого в течение 1 месяца, электролитный баланс оставался нормальным, суточный диурез был адекватным, на ЭКГ изменений не наблюдалось.

**Заключение:** БАД «Нефролентин» может применяться в качестве общеукрепляющего средства, улучшающее функциональное состояние мочевыделительной системы, в том числе при инфекционных заболеваниях почек и мочевыводящих путей.



# Энтеролептин

Биологически активная добавка к пище Энтеролептин разработана учеными и специалистами Сибирского отделения Российской академии медицинских наук

## СОСТАВ: экстракты:

- прополиса
- корня бадана
- цветков ноготков
- цветков ромашки
- травы тысячелистника


**БАД Энтеролептин улучшает деятельность желудочно-кишечного тракта и может использоваться при:**

- колитах
- энтероколитах
- дисбактериозе кишечника

**Безопасность БАД Энтеролептин  
подтверждена**



## Эффект БАД Энтеролептин при комплексной терапии



Клиническая эффективность  
БАД Энтеролептин подтверждена  
ГУ НЦ КЭМ СО РАМН



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУ НЦ КЭМ СО РАМН

Член-корреспондент РАМН

В.А.Шкурин

июля 2005 г.

### Рекомендации по применению БАД «Энтеролептин»

Исследования клинической эффективности БАД «Энтеролептин» ТУ 9197-012-47514137-03 при дисбактериозе кишечника, проведенные в НЦ клинической и экспериментальной медицины СО РАМН, показали улучшение общего самочувствия, более полное купирование клинической симптоматики и восстановление нормального микробиоценоза у больных, получавших БАД «Энтеролептин» на фоне общепринятой терапии.

При этом в конце лечения патогенная флора в кишечном содержимом не обнаруживалась как в опытной, так и в контрольной группах, однако диссоциация в количественном соотношении представителей нормальной микрофлоры сохранялась у 12 из 20 больных контрольной группы и только у 3-х из 20 больных исследуемой группы.

**Заключение:** БАД «Энтеролептин» ТУ 9197-012-47514137-03 может применяться в качестве общеукрепляющего средства, улучшающего функциональное состояние желудочно-кишечного тракта, в том числе при колитах, энтероколитах, дисбактериозе кишечника.

### Одна из схем применения Энтеролептина для коррекции дисоритмов

#### «Жабронканг»

|                        |       |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|
| Лептоник (Вазолептин)* | 08:00 |       |       |
| Энтеролептин           | 08:00 | 12:00 | 16:00 |
| Лептоседин             | 22:00 |       |       |

#### «Собам» и «голубям»

|                       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| Лептоник (Вазолептин) | 10:00 |       |       |
| Энтеролептин          | 10:00 | 14:00 | 18:00 |
| Лептоседин            | 24:00 |       |       |

\* – при наличии противопоказаний к Лептонику применяется Вазолептин

# Гепатолептин

Биологически активная добавка к пище Гепатолептин разработана учеными и специалистами Сибирского отделения Российской академии медицинских наук



## СОСТАВ: экстракты:

- прополиса
- травы чабреца
- цветков бессмертника
- цветков ноготков
- столбиков с рыльцами кукурузы


**БАД Гепатолептин улучшает работу печени и желчевыводящих путей и может использоваться при:**

- холециститах
- холецистохолангитах
- холангитах

**Безопасность БАД Гепатолептин  
подтверждена**



## Влияние БАД Гепатолептин при комплексной терапии



Клиническая эффективность  
БАД Гепатолептин подтверждена  
ГУ НЦ КЭМ СО РАМН



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУ НЦ КЭМ СО РАМН

Член-корреспондент РАМН

В.А.Шкурин

июля 2005 г.

### Рекомендации по применению БАД «Гепатолептин»

Исследования клинической эффективности БАД «Гепатолептин» ГУ 9197-013-47514137-03 при хроническом холангиохолецистите, проведенные в НЦ клинической и экспериментальной медицины СО РАМН, показали, что при применении данной БАД на фоне традиционной терапии происходило более быстрое и полное купирование клинической симптоматики, нормализация функциональных проб печени.

При этом у больных, получавших БАД, достоверно снизились показатели уровня холестерина, билирубина и ГГТ, тогда как у пациентов в группе, получавшей только традиционную терапию, отмечено снижение только уровня холестерина.

Полученные результаты свидетельствуют о наличии у данной БАД не только противомикробного, противовоспалительного, желчегонного, но и гепатопротекторного действия.

**Заключение:** На основании результатов клинических исследований БАД «Гепатолептин» может быть рекомендована в качестве общеукрепляющего средства, улучшающего функциональное состояние печени и желчевыводящих путей, в том числе при холециститах, холецистохолангитах, холангитах.

### Одна из схем применения Гепатолептина для коррекции дисоритмов

#### «Жаборонок»

|                        |       |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|
| Лептоник (Вазолептин)* | 08-00 |       |       |
| Гепатолептин           | 08-00 | 12-00 | 16-00 |
| Лептоседин             | 22-00 |       |       |

#### «Собам» и «Золудям»

|                       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| Лептоник (Вазолептин) | 10-00 |       |       |
| Гепатолептин          | 10-00 | 14-00 | 18-00 |
| Лептоседин            | 24-00 |       |       |

\* – при наличии противопоказаний к Лептонику применяется Вазолептин

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ СПРАШИВАЙТЕ АННОТАЦИЮ



# Вазолептин

Биологически активная добавка к пище Вазолептин разработана учеными и специалистами Сибирского отделения Российской академии медицинских наук

## СОСТАВ: экстракты:

- прополиса
- трав зверобоя
- плодов шиповника
- цветков ноготков
- корня левзеи
- сафлоровидной
- плодов рябины черноплодной

**БАД Вазолептин улучшает состояние сосудов ЦНС и может использоваться при:**

- нейроциркуляторной дистонии
- дисциркуляторном синдроме
- остеохондрозе шейного отдела позвоночника
- атеросклерозе сосудов головного мозга
- остаточных явлениях после перенесенных инсультов, нейроинфекций и черепно-мозговых травм



## Влияние БАД Вазолептин при комплексной терапии



## Некоторые схемы применения Вазолептина для коррекции биоритмов

### При десинхроне (рассогласовании биоритмов)

| ‘Жабаронкам’ |       | ‘Собам’ и ‘голубям’ |       |
|--------------|-------|---------------------|-------|
| Вазолептин   | 08-00 | Вазолептин          | 10-00 |
| Лептоседин   | 22-00 | Лептоседин          | 24-00 |

### Для улучшения состояния сердечно-сосудистой системы в целом

| ‘Жабаронкам’ |                   | ‘Собам’ и ‘голубям’ |                   |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Вазолептин   | 08-00             | Вазолептин          | 10-00             |
| Кардиолептин | 12-00 16-00 20-00 | Кардиолептин        | 14-00 18-00 22-00 |
| Лептоседин   | 22-00             | Лептоседин          | 24-00             |

### При артериальной гипертензии

| ‘Жабаронкам’ |                   | ‘Собам’ и ‘голубям’ |                   |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Вазолептин   | 08-00             | Вазолептин          | 10-00             |
| Кардиолептин | 12-00 16-00 20-00 | Кардиолептин        | 14-00 18-00 22-00 |
| Нефролептин  | 10-00             | Нефролептин         | 11-00             |
| Лептоседин   | 22-00             | Лептоседин          | 24-00             |

### При нарушении мозгового кровообращения

| ‘Жабаронкам’ |                   | ‘Собам’ и ‘голубям’ |                   |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Вазолептин   | 08-00 12-00 16-00 | Вазолептин          | 10-00 14-00 18-00 |
| Лептоседин   | 22-00             | Лептоседин          | 24-00             |

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУ НЦ КЭМ СО РАМН

**Клиническая эффективность  
БАД Вазолептин подтверждена  
ГУ НЦ КЭМ СО РАМН**

Член-корреспондент РАМН

В.А. Шкуратый

июня 2005 г.


### Рекомендация по применению БАД «Вазолептин»

Исследования клинической эффективности БАД «Вазолептин» ГУ 9197-016-47514137-03 при дисциркуляторной энцефалопатии, проведенные в НЦ клинической и экспериментальной медицины СО РАМН, показали более выраженное снижение очаговой и общемозговой симптоматики по сравнению группой, получавшей только традиционную терапию. При этом особое внимание на себя обращает тот факт, что клиническое улучшение не сопровождалось достоверными изменениями мозговой гемодинамики по сравнению с группой, получавшей только традиционную терапию. Это позволяет утверждать, что улучшение клинической картины связано в большей мере не с улучшением состояния венозного оттока, а с нормализацией обменных процессов в нервной ткани в условиях нарушенного кровообращения и уменьшением гипоксических и постгипоксических повреждений тканей головного мозга.

**Выводы:** На основании результатов клинических исследований БАД «Вазолептин» может рекомендоваться в качестве общеукрепляющего средства, улучшающего мозговое кровообращение, защищающего ткани головного мозга от ишемических и свободнорадикальных повреждений.

БАД «Вазолептин» может применяться при нейроциркуляторной дистонии, при дисциркуляторном синдроме, остеохондрозе шейного отдела позвоночника, атеросклерозе сосудов головного мозга, остаточных явлениях после перенесенных инсультов, нейроинфекций и черепно-мозговых травм.

**Безопасность БАД Вазолептин  
подтверждена**



ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ СПРАШИВАЙТЕ АННОТАЦИЮ

СЗЗ № 77.99.20.919.Б.000780.05.04 от 31.05.2004г.



# Кардиолептин

Биологически активная добавка к пище Кардиолептин разработана учеными и специалистами Сибирского отделения Российской академии медицинских наук

## СОСТАВ: экстракты:


- прополиса
- листьев мяты перечной
- плодов боярышника
- цветков ноготков
- плодов шиповника

**БАД Лептоседин улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы и может использоваться при:**

- гипертонической болезни
- атеросклерозе
- ишемической болезни сердца



## Эффект БАД Кардиолептин при комплексной терапии



Безопасность БАД Кардиолептин подтверждена

Некоторые схемы применения Кардиолептина для коррекции биоритмов

Для улучшения состояния сердечно-сосудистой системы в целом

| ‘Жаборонкам’ |                   |
|--------------|-------------------|
| Вазолептин   | 08-00             |
| Кардиолептин | 12-00 16-00 20-00 |
| Лептоседин   | 22-00             |

| ‘Собам’ и ‘голубям’ |                   |
|---------------------|-------------------|
| Вазолептин          | 10-00             |
| Кардиолептин        | 14-00 18-00 22-00 |
| Лептоседин          | 24-00             |

При артериальной гипертензии

| ‘Жаборонкам’ |                   |
|--------------|-------------------|
| Вазолептин   | 08-00             |
| Кардиолептин | 12-00 16-00 20-00 |
| Нефролептин  | 10-00             |
| Лептоседин   | 22-00             |

| ‘Собам’ и ‘голубям’ |                   |
|---------------------|-------------------|
| Вазолептин          | 10-00             |
| Кардиолептин        | 14-00 18-00 22-00 |
| Нефролептин         | 11-00             |
| Лептоседин          | 24-00             |

При повышенной функции щитовидной железы

| ‘Жаборонкам’ |                   |
|--------------|-------------------|
| Кардиолептин | 08-00 12-00 16-00 |
| Лептоседин   | 22-00             |

| ‘Собам’ и ‘голубям’ |                   |
|---------------------|-------------------|
| Кардиолептин        | 10-00 14-00 18-00 |
| Лептоседин          | 24-00             |



Клиническая эффективность  
БАД Кардиолептин подтверждена  
ГУ НЦ КЭМ СО РАМН



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУ НЦ КЭМ СО РАМН

Член-корреспондент РАМН

В.А.Шкурин

июль 2005 г.



### Рекомендации по применению БАД «Кардиолептин»

Исследования клинической эффективности БАД «Кардиолептин», ГУ 9197-017-47514137-03 при гипертонической болезни, проведенные в НЦ клинической и экспериментальной медицины СО РАМН, показали, что при применении данной БАД на фоне традиционной терапии происходила более быстрая нормализация артериального давления, улучшение состояния больных.

При этом в группе больных, получавших БАД, наблюдалась более выраженная положительная динамика ЭКГ, чем в контрольной группе. В биохимических анализах крови обнаружено достоверное снижение уровня холестерина и фибриногена. В контрольной группе достоверных изменений биохимических показателей не было выявлено. Также БАД «Кардиолептин» проявил высокие антиоксидантные свойства, нормализуя уровень продуктов перекисного окисления липидов в ЛНП крови.

Особого внимания заслуживает нормализация ЭКГ-картины у пациентов, получавших БАД. В опытной группе количество больных с нормальной ЭКГ картиной возросло с 30 до 70% (для сравнения, в контрольной группе – с 40 до 50%), что свидетельствует о нормализации обменных процессов в миокарде и уменьшением ее гипоксических и постгипоксических повреждений под действием данной БАД.

**Заключение:** На основании результатов клинических исследований БАД «Кардиолептин» может быть рекомендована в качестве общеукрепляющего средства, улучшающего функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, защищающего сердечную мышцу от ишемических и свободнорадикальных повреждений, в том числе при гипертонической болезни, атеросклерозе, ишемической болезни сердца.

# Гемолептин

Биологически активная добавка к пище Гемолептин разработана учеными и специалистами Сибирского отделения Российской академии медицинских наук



## СОСТАВ: экстракты:

- прополиса
- корня дягиля лекарственного
- корня солодки
- травы хвоща полевого
- травы душицы
- корня одуванчика
- листьев крапивы
- травы лабазника вязолистного



## БАД Лептопротект предназначена для профилактики и комплексной терапии ряда заболеваний системы крови:

- анемий, развивающих в результате хронических кровотечений
- угнетения кроветворения при различных хронических инфекционных и воспалительных заболеваниях
- нарушений, вызванных различными повреждающими факторами, в том числе ионизирующей радиацией и некоторыми лекарственными препаратами
- дефицита алиментарного кремния и селена
- нарушений свертываемости крови, обусловленных дефицитом витамина А

**Безопасность БАД Гемолептин  
подтверждена**



ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ СПРАШИВАЙТЕ АННОТАЦИЮ

# Хондролептин

Биологически активная добавка к пище Хондролептин разработана учеными и специалистами Сибирского отделения Российской академии медицинских наук



## СОСТАВ: экстракты:

- прополиса
- корня дягиля лекарственного
- цветков пижмы
- фиалки трехцветной
- корня солодки
- коры ивы белой



**БАД Лептопротект предназначена для улучшения функции опорно-двигательного аппарата и применяется в комплексной терапии ряда заболеваний соединительной ткани:**

- остеохондроза
- остеоартроза
- первичных и вторичных артритов
- невритов, нейропатий

**Безопасность БАД Хондролептин  
подтверждена**



ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ СПРАШИВАЙТЕ АННОТАЦИЮ



# Офальмолептин

Биологически активная добавка к пище Офальмолептин разработана учеными и специалистами Сибирского отделения Российской академии медицинских наук

## СОСТАВ: экстракты:

- прополиса
- плодов рябины черноплодной
- кукурузных рыльцев
- травы зверобоя
- очанки лекарственной
- черники



## БАД Офальмолептин предназначена для профилактики и комплексной терапии:

- дегенеративно-дистрофических заболеваний глаз
- воспалительных заболеваний глаз
- патологии сосудов клетчатки
- близорукости
- нарушений сумеречного зрения (куриная слепота)
- последствий повышенной нагрузки на зрительный аппарат, 'глазного офисного' и 'глазного компьютерного' синдромов

**Безопасность БАД Офальмолептин  
подтверждена**



ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ СПРАШИВАЙТЕ АННОТАЦИЮ



# Мумичага 100

Биологически активная добавка к пище Мумичага 100 разработана учеными и специалистами Сибирского отделения Российской академии медицинских наук

## СОСТАВ:

- экстракт чаги сибирской
- мумие горноалтайское очищенное

Мумичага 100 - уникальный комплекс веществ горноалтайского мумие и чаги сибирской, обладающих уникальным строением и высокими биологически активными свойствами. Мумичага 100:

- активизирует физиологические процессы
- повышает защитные силы организма
- снижает количество свободных радикалов в организме
- способствует продлению молодости и достижению активного долголетия

БАД Мумичага 100 предназначена для профилактики и в комплексной терапии ряда заболеваний и патологических состояний:

- для заживления ран, язв, ожогов
- при травмах опорно-двигательного аппарата
- при язвенной болезни 12-перстной кишки
- при астеническом синдроме
- в качестве общеукрепляющего средства при тяжелых инфекциях
- для снижения побочного действия лучевой и химиотерапии



**Безопасность БАД Мумичага 100  
подтверждена**

№ 9/22



**АПИФАРМ**

[www.apifarm.ru](http://www.apifarm.ru)

[apifarm@apifarm.ru](mailto:apifarm@apifarm.ru)